

AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A LA REPÚBLICA DE CHILE ANTE CASOS DE SARAMPIÓN


La SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, a través del UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA (UIES) emite el siguiente aviso preventivo de viaje ante los casos de **Enfermedad por Virus del Sarampión** en la República de Chile.

08 | Junio | 2015

UIES-AVISO-VIAJE-CHILE-SARAMPION



Atención a los viajeros a la República de Chile, ante la situación de brotes de Enfermedad por el Virus del Sarampión.



LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL RECOMIENDA TOMAR PRECAUCIONES ESPECÍFICAS PARA LOS VIAJES A LA REPÚBLICA DE CHILE, DEBIDO A CASOS DE SARAMPIÓN.

La infección causada por el Virus del Sarampión produce una enfermedad aguda, la cual es altamente contagiosa.

La sintomatología se caracteriza por presentar fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y posteriormente, erupciones cutáneas en cara y cuello que con el tiempo se extiende a todo el cuerpo. Se propaga por contacto con gotitas provenientes de la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada. *El Sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación.*

La enfermedad es más grave en los lactantes, malnutridos y en los adultos que en los niños. Las complicaciones son la diarrea severa, infecciones del oído, neumonía, ceguera y encefalitis (inflamación del cerebro) que puede conducir a la muerte.

El sarampión continúa siendo una enfermedad persistente en diferentes regiones del mundo, tales como algunas zonas de África y Asia. Anteriormente se han reportado brotes en Europa, Canadá y Estados Unidos de América. En Latinoamérica el sarampión ha sido eliminado, sin embargo, pueden ocurrir brotes cuando el virus es importado de otros países.

Para el caso de **Chile**, se interrumpió la transmisión autóctona del virus de sarampión en 1993, posterior a una campaña de vacunación intensa en menores de 15 años de edad. Chile se certificó por la eliminación de sarampión y rubéola, fue ratificado por el Comité Internacional de Eliminación de estas enfermedades de la Organización Panamericana de Salud en 2011. **Después de tres años sin casos, desde las últimas importaciones en 2011, en mayo de 2015, Chile ha informado sobre la confirmación de tres casos de sarampión.**

AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A LA REPÚBLICA DE CHILE ANTE CASOS DE SARAMPIÓN

En México la última epidemia de sarampión fue en 1989 y 1990 reportándose 89,163 casos. En el 2011 se presentaron tres casos importados en el Distrito Federal (2) y Guanajuato (1) y durante el 2013 y 2014 se han reportado casos en viajeros extranjeros. Anteriormente en 2014 y 2015, se reportaron casos aislados importados a nuestro país; derivado del pasado brote de sarampión, originado en el estado de California, E. U. A.

Las medidas de prevención y control, y el Programa de Vacunación Universal implementados por México han permitido reducir drásticamente la morbilidad y la eliminación autóctona del virus en nuestro país.

Entre el **11 de junio** y el **4 de julio de 2015** se llevará a cabo en Chile la **XLIV edición del torneo “Copa América 2015”**, competencia futbolística entre selecciones nacionales de América; este evento implicará movimiento, traslado y aglomeraciones de personas entre diversos países lo cual implica un riesgo de transmisión de enfermedades, como el Sarampión, si no se llevan a cabo las medidas preventivas.

Por lo anterior, la DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA emite las siguientes recomendaciones a viajeros que se dirijan a Chile o que regresen a México proveniente de Chile:

Antes de su viaje: Aplicar la vacuna contra el sarampión:

- Las personas que no puedan demostrar que fueron vacunados cuando eran niños y que nunca han tenido sarampión deben ser vacunados.
- Los niños en México rutinariamente reciben vacunación contra el sarampión a los 12 meses de edad se aplica la primera dosis, y a los 6 años de edad o al ingresar a la primaria se aplica la segunda dosis.
- Los lactantes vacunados antes de los 12 meses deben ser revacunados en o después del primer año con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días.
 - *La vacuna “doble viral” o SR se aplicará en situaciones especiales, cuando haya casos de sarampión en una región, se aplicará a partir de los seis meses de edad sin que esta dosis forme parte del esquema de vacunación.*
- Los adolescentes y adultos que no cuenten con dos dosis de vacuna deben vacunarse. Si no cuenta con antecedente deberá recibir dos dosis separadas por al menos 28 días.
- Dos dosis de SRP representan casi el 100% de efectividad en la prevención del sarampión.
- **Las únicas vacunas contra el sarampión disponibles en México son:**
 - Vacuna triple viral (SRP; sarampión, rubéola y paperas).
 - Vacuna doble viral (SR; sarampión y rubéola)
- **NO EXISTE NINGUNA RELACIÓN ENTRE LA SRP Y EL AUTISMO.**

Durante su viaje y a su regreso: Si usted presenta **fiebre** y **exantema (erupción)** durante su viaje y hasta después de 21 días de su regreso a México:

- **No se auto-medique** y **busque atención médica de inmediato.**
- Tome abundantes líquidos y **vida suero oral** o electrolitos orales para prevenir la deshidratación.
- Comente con el personal médico que lo atienda el antecedente de viaje a estas regiones.

AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A LA REPÚBLICA DE CHILE ANTE CASOS DE SARAMPIÓN

- Evite el contacto cercano con otras personas durante cuatro días después de la aparición de la erupción cutánea (exantema), con el fin de reducir la propagación a otras personas o familiares que no estén vacunados.
- Si usted todavía está enfermo a su llegada a México, por favor, dígame al asistente de vuelo antes de aterrizar o el oficial del Servicio de Sanidad Internacional cuando salga del vuelo.

Durante su estancia o tránsito en Chile, se recomiendan medidas higiénicas generales, para reducir el riesgo de contagio:

- Lávese las manos con frecuencia.
- Si el jabón y agua no están disponibles, lávese las manos con gel desinfectante de manos (que contenga al menos un 60% de alcohol).
- Procure no tocar sus ojos, nariz o boca. Si tiene que tocar su cara, asegúrese de que sus manos estén limpias.
- Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la manga (no con las manos) al toser o estornudar.
- Trate de evitar el contacto cercano, como besos, abrazos o compartir cubiertos o vasos, con personas que estén enfermas.
- Tenga a la mano los teléfonos, dirección del consulado o embajada de los Estados Unidos Mexicanos más cercano, para contactarlo en caso necesario.

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 53-37-18-45 o LADA sin costo 01-800-00-44-800, donde será atendido por personal altamente capacitado.

En caso de antecedente de viaje a **Chile** en los últimos **21 días o haber tenido contacto con personas que hayan viajado a este país** y presentar **fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y/o erupciones cutáneas** debe de solicitar atención médica e informar del antecedente de viaje.

Para que se lleve a cabo la **notificación inmediata** y con carácter de **urgente** a los respectivos niveles de salud y al mismo tiempo a la **Dirección General de Epidemiología** a través de los mecanismos establecidos, así como por medio de la **UIES** al teléfono **53-37-18-45** llamada local del Distrito Federal o LADA sin costo **01-800-00-44-800**.