



AVISO PREVENTIVO DE VIAJE A PAÍSES ENDÉMICOS DEL *POLIOVIRUS* SALVAJE Y PAÍSES CON RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL *POLIOVIRUS* DERIVADO DE LA VACUNA.

10 | Octubre | 2019


[UIES-AVISO-VIAJE-PVDVc-v01-2019] →

Puntos clave:

- Recientemente, **Filipinas** declaró un brote de poliomielitis. Se han reportado dos casos, ambos causados por el ***poliovirus derivado de la vacuna tipo 2*** (VDPV2).
- Adicionalmente, se han detectado VDPV2 en muestras ambientales de aguas residuales en Manila y en una vía fluvial en Davao.
- La poliomielitis causada por *poliovirus salvaje* permanece presente (endémica) en tres países: **Afganistán, Nigeria y Pakistán.**
- La polio es una enfermedad altamente contagiosa; puede causar parálisis y muerte.**
- El virus se propaga a través de las heces de una persona infectada con el virus. Entra en el cuerpo a través de la boca, principalmente por alimentos o agua contaminada con heces.
- No existe cura para la poliomielitis, pero se puede prevenir mediante la vacunación.**
- Aumenta el riesgo en personas no vacunadas o con esquemas incompletos.

Nivel de riesgo

Nivel 2:
El riesgo es moderado.
Practicar precauciones adicionales.
(vacunación)



Síntomas:

- Síntomas iniciales:** fiebre, cansancio, sueño, dolor de cabeza, náusea, vómito y dolores musculares.
- Forma grave:** **Parálisis o tono muscular disminuido en menos de cinco días.**

Países con riesgo de propagación del *poliovirus*:

- | | | |
|----------------------|--------------|-----------|
| • Angola | • China | • Somalia |
| • Benín | • Ghana | |
| • Birmania | • Indonesia | |
| • Camerún | • Mozambique | |
| • R. Centro Africana | • Níger | |
| • R. D. del Congo | • Filipinas | |
| • Papúa Nueva Guinea | • Etiopía | |

- Países endémicos**
- Afganistán
 - Pakistán
 - Nigeria

Antes de su viaje:

- Asegúrese de **contar con las vacunas** contra la poliomielitis según el **esquema nacional de vacunación.**
- En **México** se aplica la **vacuna Pentavalente acelular (DPaT+IPV+Hib)/Hexavalente (DPaT+IPV+Hib+HB)**, que **protege contra la poliomielitis**, esta vacuna incluye los virus inactivados tipos 1, 2 y 3; y se aplica en un esquema de **cuatro dosis**, a los **2, 4, 6 y 18 meses de edad** (Antes del año 2007 se aplicaba únicamente la vacuna oral Sabin).
- Como dosis adicional se aplica la vacuna bivalente oral contra poliovirus (bOPV) o Sabin contra los poliovirus tipo 1 y 3, durante jornadas intensivas de vacunación a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad con antecedente documentado de dos dosis de vacuna IPV (Pentavalente acelular/Hexavalente).

Durante su viaje:

Debe realizar estrictas medidas de higiene:

- Lavado de manos con frecuencia.** Use jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos.
- Solo **coma alimentos bien cocinados** y servidos calientes. **Beba agua** que haya sido **hervida, desinfectada o embotellada** comercialmente.

Después a su viaje:

Si ha viajado a alguno de los países y a su regreso a México presenta **signos y síntomas** de la enfermedad **hasta 35 días después de su retorno**, solicite **atención médica inmediata** y refiera su antecedente de viaje.

Información adicional:

- Secretaría de Salud
- Organización Mundial de la Salud
- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
- Iniciativa Global de Erradicación de la Polio

Para cualquier duda puede comunicarse a la **UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA** a los teléfonos **55 5337-1845** o al **800-0044-800**, donde será atendido por personal altamente capacitado las 24 horas.